

ВАКЦИНАЦИЯ ПЕРЕД ШКОЛОЙ



ВАКЦИНАЦИЯ ПЕРЕД ШКОЛОЙ

СВОЕВРЕМЕННАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
И РЕВАКЦИНАЦИЯ ПОМОГАЮТ:



Защитить
ребёнка от инфекции



Предотвратить
пропуски занятий



Избежать необходимости брать
больничный лист по уходу за ребёнком
и отсутствовать на работе





КАКИЕ ПРИВИВКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ У РЕБЕНКА К ШКОЛЬНОМУ ВОЗРАСТУ?

К 6-7 ГОДАМ РЕБЁНОК ПОЛУЧАЕТ ВАКЦИНЫ ОТ СЛЕДУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:

туберкулёз

1  прививка

гепатит В

3    прививки

пневмококковая
инфекция

3    прививки

коклюш, дифтерия,
столбняк

4     прививки

гемофильная
инфекция тип b

3    прививки

полиомиелит

5      прививок

корь, эпидемический
паротит, краснуха


1  прививка

грипп

ежегодно 

Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
https://rosпотребнадзор.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=12498 Дата обращения: 19.09.2019

ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЗАМЕНЯЕТ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА, ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ





РЕВАКЦИНАЦИЯ ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ В ШКОЛУ

ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ В ШКОЛУ И В ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
ДЕТЯМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ РЕВАКЦИНАЦИЮ
ОТ СЛЕДУЮЩИХ ИНФЕКЦИЙ:



Корь, эпидемический паротит, краснуха

в 6 лет



Коклюш, столбняк, дифтерия

в 6-7 лет



Грипп

ежегодно

Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
https://rosпотребнадзор.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=12498 Дата обращения: 19.09.2019

ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЗАМЕНЯЕТ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА, ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ



КОКЛЮШ, ДИФТЕРИЯ, СТОЛБНЯК

КОКЛЮШ – острая воздушно-капельная бактериальная инфекция, проявляющаяся длительными и мучительными приступами спазматического кашля и интоксикацией.



Инфекция передаётся от больного человека здоровым воздушно-капельным путём, при кашле, чихании, смехе.



Больной коклюшем опасен для окружающих с первого дня и до 30 суток болезни.



Более половины всех случаев коклюша в РФ регистрируется у детей в возрасте от 3 до 14 лет. Причина - снижение поствакцинального иммунитета, что приводит к восстановлению восприимчивости к коклюшу, начиная с возраста 5-7 лет, если ревакцинация вовремя не проведена.

Симптомы

Первый период заболевания длится 2 недели

- Лихорадка
- Выделения из носа
- Слабость
- Симптомы схожи с картиной начала ОРВИ




Позже кашель усиливается и приобретает спазматический характер. Характерный для коклюша кашель, мучительный и изнуряющий, может сохраняться до полугода. В течение 21 дня ребёнок может оставаться на домашнем или больничном режиме.

КОКЛЮШ ОПАСЕН СВОИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ, ОН МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К ПНЕВМОНИИ, ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ СУДОРОГАМ, НАРУШЕНИЯМ ФУНКЦИИ ЛЁГКИХ.

Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
https://rosпотребнадзор.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=12498 Дата обращения: 19.09.2019

ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЗАМЕНЯЕТ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА, ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ





КОКЛЮШ, ДИФТЕРИЯ, СТОЛБНЯК

ДИФТЕРИЯ – тяжёлая и опасная для жизни бактериальная инфекция, вызываемая дифтерийной палочкой.



Чаще передаётся воздушно-капельным или контактным путем.

Симптомы



Протекает с симптомами острого воспаления ротоглотки, часто затрагивая гортань, бронхи, кожу и другие органы.



В начальной стадии болезнь очень схожа с ангиной.



Опасна поражением сердца, почек и нервной системы, в 10% случаев приводит к смерти от удушья

Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
https://rosпотребнадзор.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=12498 Дата обращения: 19.09.2019

ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЗАМЕНЯЕТ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА, ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ





КОКЛЮШ, ДИФТЕРИЯ, СТОЛБНЯК

СТОЛБНЯК – крайне опасное инфекционное заболевание бактериальной природы. Возбудитель, столбнячная палочка, обитает в кишечнике животных, а попадая в почву, трансформируется в споры.



Чаще всего заражение происходит через повреждённую кожу, загрязнённые открытые раны.



Столбняк не заразен - он не может передаваться от человека к человеку.



Перенесенное заболевание не оставляет после себя иммунитета.

Симптомы



Болезнь протекает очень тяжело, с поражением нервной системы, судорогами, приводя в 20 % случаев к смерти.



Даже при наличии современных блоков интенсивной терапии в больницах уровень летальности очень высок. При отсутствии медицинского вмешательства летальность приближается к 100 %.

Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
https://rosпотребнадзор.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=12498 Дата обращения: 19.09.2019

ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЗАМЕНЯЕТ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА, ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ





КУРС ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ КОКЛЮША*, ДИФТЕРИИ, СТОЛБНЯКА

Первичный курс
вакцинации¹



3+4,5+6
месяцев



18
месяцев

Ревакцинация дошкольников
и школьников²⁻⁴



6-7 лет



14 лет

Ревакцинации
взрослых^{2,3}



каждые
10 лет

*Ревакцинация против коклюша проводится в составе комбинированных вакцин

1. Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 № 125 "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям" (в ред. 2019 г.)

2. Согласованное мнение экспертов VIII Образовательного международного консенсуса по респираторной медицине в педиатрии по вопросам организации вакцинации против коклюша. URL - http://pulmodeti.ru/wp-content/uploads/VIII_kok.pdf (по состоянию на 19.03.2019)

3. Междисциплинарное совещание экспертов «Нерешенные вопросы эпидемиологии коклюша в РФ и новые возможности его вакцинопрофилактики. Эпидемиология и вакцинопрофилактика 2018; 17 (4): 63-67.

4. Намазова-Баранова Л. С., Федосеев М. В., Баранов А. А. Новые горизонты Национального календаря профилактических прививок. Журнал «Вопросы современной педиатрии». 2019; 18 (1) 13-30.

ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЗАМЕНЯЕТ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА, ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Представительство АО «Санофи-авентис груп» (Франция), 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22.
Тел.: (495) 721-14-00, факс (495) 721-14-11, www.sanofi.ru



SPRU.ADAC.19.09.0178
от 03.10.2019